

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜΑ

Σταβάρα Μαρία Ελουίζα (1), Χατζηαγγελάκη Βέτα (1), Τερζίδης Αγάπιος (1), Καραμαγκιώλη Εβίκα (1), Ναούμης Χρήστος (1), Πικουλής Εμμανουήλ (1, 2)

(1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παγκόσμια Υγεία - Ιατρική των Καταστροφών, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
(2) Γ' Παν/κή Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ «Αττικών», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η στοματική υγεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής υγείας και σχετίζεται άμεσα με το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο του ατόμου. Οι κοινότητες Ρομά στην Ελλάδα συνιστούν ευπαθείς ομάδες και βιώνουν έντονο κοινωνικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβασή στις υπηρεσίες υγείας και στην οδοντιατρική φροντίδα.

ΣΚΟΠΟΣ: Βιβλιογραφικά δεν υφίσταται κάποια επίσημη μελέτη που να καταγράφει το επίπεδο στοματικής υγείας των παιδιών και εφήβων Ρομά στην Ελλάδα. Η διεξαγωγή της παρούσας μελέτης σκοπεύει στην καταγραφή για πρώτη φορά και αξιολόγηση του επιπέδου στοματικής υγείας του συγκεκριμένου πληθυσμού, ώστε να εκτιμηθούν οι σχετικές ανάγκες και να σχεδιαστούν τα κατάλληλα μέτρα Δημόσιας Υγείας.



ΥΛΙΚΟ: Συμπλήρωση εντύπου αξιολόγησης Στοματικής Υγείας Παιδιών του ΠΟΥ κατόπιν κλινικής εξέτασης παιδιών και εφήβων Ρομά ηλικίας 3-18 ετών στον Γέρακα (30 άτομα), στο Κορωπί Αττικής (50 άτομα), και Σπάτα (21 άτομα).



ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγχρονική μελέτη με κλινική στοματική εξέταση παιδιών/εφήβων Ρομά, η οποία πραγματοποιήθηκε στους οικισμούς τους.

Οι κηδεμόνες ενημερώθηκαν προφορικά, παρέλαβαν γραπτό έντυπο ενημέρωσης και υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης.

Κατά την εξέταση συλλέχθηκαν δημογραφικά στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, βαθμίδα εκπαίδευσης) και έγινε καταγραφή τερηδόνας (δείκτης DMFT), αιμορραγίας ούλων, οδοντικής διάβρωσης και τραύματος, φθορίασης και βλαβών στοματικού βλεννογόνου.

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το PSPP. Ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε το δείγμα ευκολίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το δείγμα αποτελείται από 51 θήλεα (50,5%) και 50 αρρένα (49,5%) άτομα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 52,5% είναι 7-12 ετών (μεικτός φραγμός) και ακολουθούν οι ηλικίες 3-6 ετών (νεογιλός φραγμός) με ποσοστό 32,7% και 13-18 ετών (μόνιμος φραγμός) με ποσοστό 14,9%. Το 63,4% δεν χρησιμοποιεί οδοντόβουρτσα. Το 87% έχει προβλήματα τερηδόνας ενώ το 31,7% εμφανίζει συμπτώματα περιοδοντικής νόσου. Το 72% χρήζει άμεσης και επείγουσας παραπομπής. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος χ² και για επίπεδο σημαντικότητας α=0.05. Προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστική εξάρτηση μεταξύ του φύλου και της χρήσης οδοντόβουρτσας (0.838>0.05) ή της αναγκαιότητας για επείγουσα παρέμβαση (0.515>0.05). Επίσης δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της χρήσης οδοντόβουρτσας και της αναγκαιότητας για επείγουσα παρέμβαση (0.072>0.05).

| Intervention Urgency (0-3) | Frequency | Percent |
|----------------------------|-----------|---------|
| 0 | 10 | 9.9% |
| 1 | 18 | 17.8% |
| 2 | 30 | 29.7% |
| 3 | 43 | 42.6% |
| Total | 101 | 100% |

Πίνακας 1.

Σχετικά με την αναγκαιότητα για παρέμβαση και το πόσο επείγουσα αυτή χαρακτηρίζεται, για το 72% χαρακτηρίζεται επείγουσα και εξαιρετικά επείγουσα (βαθμός 2 και 3).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει το χαμηλό επίπεδο στοματικής υγείας των παιδιών και εφήβων Ρομά και την άμεση ανάγκη παρεμβάσεων προαγωγής στοματικής υγείας στο συγκεκριμένο πληθυσμό.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

- Pilát Z, Gaľová J, Petrejčíková E, Mathia M, Boroňová I, Bernasovská J. Oral health status of 6- and 12-year-old children of Roma origin from Eastern Slovakia: a pilot study. Cent Eur J Public Health. 2020 Dec;28(4):292-6.
- Rodriguez-Alvarez E, Borrell LN, Maraňon E, Lanborena N. Immigrant Status and Ethnic Inequities in Dental Caries in Children: Bilbao, Spain. Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 8;19(8):4487.
- García-Barata AR, Ventura I, Ribas-Pérez D, Flores-Fraile J, Castaño-Séiquer A. Oral Health Status in a Group of Roma Children in Seville, Spain. Healthcare (Basel). 2023 Apr 3;11(7):1016.